

Avertissements agricoles

DLP 22-6-88002937

ISSN 0751-154 X ®



Grandes cultures

Bulletin Technique n°14 du 16 juin 1988

BETTERAVES

* **PUCERONS : A SURVEILLER**

* **CERCOSPORIOSE : LES PREMIERES ATTAQUES**

POIS PROTEAGINEUX

* **BOTRYTIS - ANTHRACNOSE : QUELLE STRATEGIE DE TRAITEMENT A LA FLORAISON ?**

SOJA

* **VANESSE : DES CHENILLES SONT OBSERVEES**

BETTERAVES

PUCERONS : A SURVEILLER

La présence de pucerons noirs (*Aphis fabae*) commence à être notée en cultures en région de Wissembourg et dans le Haut-Rhin - à degré moindre dans les autres régions.

Contrôlez vos parcelles. Intervenez si une betterave sur deux est porteuse d'une colonie de pucerons noirs.

Produits utilisables

- diméthoate (500 g de m.a.)
- formothion (Anthio fort - 1,5 l)
- mévinphos (Phosdrin W10 - Phoslit-3,5 l)

- oxydéméton méthyl (Métasystémox R - Anthonos - 0,8 l)
- parathion éthyl et méthyl (200 - 300 g de m.a.)
- phosphamidon (Dimécron 10 - 3 l)
- pyrimicarbe (Pirimor G - 0,5 kg)
- vamidothion (Sépaphid - Kilval - 1,25 l).

Associations :

- Gusathion MS - 2,5 kg
- Décis B - 0,5 l
- Posidor - 1,7 l
- Mavrik B - 0,6 l
- Diptérex MR - 1,5 l
- Sumiméton - 1 l.

CERCOSPORIOSE : LES PREMIERES ATTAQUES


Les premières attaques sont observées au Sud de STRASBOURG. Surveillez attentivement les parcelles.

Imprimerie de la Station de STRASBOURG
Directeur-Gérant: P. BERTHIER

Publication périodique
CPPAP n° 1848 AD
Abonnement annuel: 180,- F

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
D.R.A.F.
Service Régional de la Protection des Végétaux

Cité Administrative
67084 STRASBOURG CEDEX
T 88.37.32.18
Bas-Rhin: 88.69.65.89 - Haut-Rhin: 89.72.49.70




P 306

POIS PROTEAGINEUX

BOTRYTIS - ANTHRACNOSE : QUELLE STRATEGIE DE TRAITEMENT A LA FLORAISON ?

Les cultures arrivent à la floraison ; ce stade marque la fin du risque "mildiou" mais, par contre le début de sensibilité des pois à l'antracnose et au botrytis.

➔ contre l'antracnose



➔ contre le botrytis



Symptômes : taches rousses à centre clair en dépression ou taches brunes à centre foncé avec des cercles concentriques.

Traitez à partir de la floraison si vous observez des symptômes : appréciez l'importance de l'attaque sur les points d'attache des folioles, les noeuds et le collet.

Symptômes : pourriture molle à l'insertion des pétales puis nécroses brunes - passage ultérieur sur gousses.

Intervenez 8- 10 jours après la floraison si les conditions climatiques sont favorables au botrytis (temps humide : températures supérieures à 25°C). Ce traitement évite la contamination des gousses.

S O J A

VANESSE : DES CHENILLES SONT OBSERVEES DANS CERTAINES PARCELLES

Description : chenilles de tailles variables, hérissées d'épines beiges à extrémités noires, et de couleur gris-jaunâtre avec plusieurs bandes longitudinales.

Dégâts : défoliations.

Les dégâts sont actuellement très limités toutefois on observe de nombreuses chenilles très jeunes, généralement cachées sous une toile sur les feuilles. Observez attentivement les parcelles. Attendre le prochain bulletin pour le traitement.